



入職時に求めるワクチン接種

チェック!



対象
全職員

流行性ウイルス疾患に対するワクチン:4種
麻疹 風疹 水ぼうそう 流行性耳下腺炎(おたふく)

接種歴の確認:「母子手帳」または「接種記録」

ある

なし

該当のワクチン接種記録

2回

1回

なし

麻疹ワクチン

◆ S47.9.30以前生:接種なし
◆ S47.10.1~H2.4.1生:1回

風疹ワクチン

◆ S37.4.1以前生:接種なし
◆ S37.4.2~S54.4.1生:女性1回
H12.4.1生以降は2回の定期接種

抗体価検査

実施する

実施しない

陽性

基準未滿の陽性

陰性

接種記録:1回

記録:なし

ワクチン1回

ワクチン2回

ワクチン1回

ワクチン2回

職場・職員本人で接種歴を保管する

接種記録は他の施設に転職した場合も使用できるので、大切に保管しましょう!

【抗体価(EIA法(IgG))と必要接種回数(例)】

	陰性:ワクチン2回	基準未滿の陽性:ワクチン1回	陽性:接種なし
麻疹	2.0未滿	2.0以上16.0未滿	16.0以上
風疹	2.0未滿	2.0以上8.0未滿	8.0以上
水ぼうそう	2.0未滿	2.0以上4.0未滿	4.0以上
おたふく	2.0未滿	2.0以上4.0未滿	4.0以上

* IgG以外の検査の抗体価は「一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン」を参照



対象 ①患者(利用者)に直接携わる職員
②血液や体液に接触する可能性がある職員

B型肝炎ワクチン

【接種スケジュール】

1シリーズ:3回接種



3回目のワクチン接種の4~8週後に抗体価を測定

陽性:接種記録を保管

陰性:1シリーズ追加接種

* 2シリーズ接種し陰性の場合は『ワクチン不応者』

* 血液に曝露した場合は厳重な対応を経過観察が必要

ご不明点は
群馬県感染症対策連絡協議会まで

群馬県感染症対策連絡協議会ICN分科会
2024.6